

PROCEDIMENTO A SEGUIR POLOS PAIS/TURORES LEGAIS ANTE A APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES COA COVID-19 NUN CENTRO EDUCATIVO DE TUI

Os signos clínicos recollidos na guía do Ministerio de Sanidade¹ e nas Instrucións da Consellería de Sanidade² que nos poden alertar de un posible caso son:



Presentou nas últimas 2 semanas?	
Síntomas respiratorios	Febre maior de 37,5°C
	Tose seca
	Dificultade respiratoria
Outros síntomas	Fatiga severa (cansazo)
	Dor muscular
	Falta de olfacto
	Falta de gusto
	Diarrea



Os pais/nais/titores/as legais, farán unha avaliación diaria dos síntomas pola mañá antes da chegada ó centro educativo.

Actuación no caso de aparecer os síntomas na casa:

Se se presenta algún destes síntomas, **NON pode acudir ó centro educativo**. Os pais/nais/titores/as legais poráanse en contacto co centro educativo para comunicar a ausencia e solicitarán cita co seu médico ou pediatra a través de chamada telefónica. Os números de contacto son:

- Citación C.Saúde Tui: 986601800
- Atención COVID para a cidadanía: 902-400-116
- Teléfono do Centro educativo: 886-11-08-08

A atención será telefónica. Será o facultativo quen determine se precisa valorar o neno de maneira presencial, se lle pauta tratamento ou se solicita unha proba PCR. No caso de solicitar unha proba PCR, daralle as instrucións do procedemento a seguir.

Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos pais/nais ou titores/as legais

Actuación no caso de aparición de síntomas nun centro educativo:

Se se presenta algún destes síntomas durante a estancia no centro educativo, o persoal do mesmo **aillará** ó nen@ e porase en contacto con vostede e co Centro de Saúde dando os datos do neno e o teléfono de contacto, e será o Centro de Saúde o que se poña en contacto con vostede.

Polo tanto, o que ten que facer son os seguintes pasos:

1. Ir recollelo neno/a o antes posible.
2. Ir para casa e quedar aillados
3. **Esperar en casa á chamada do seu Centro de Saúde para unha valoración médica**. Farano o antes posible, pero en ningún momento preocuparse pola demora. Nesa chamada valorarase a necesidade de acudir presencialmente ou pedila proba PCR, aclaración de dúbidas...

Debido a esta situación especial, e por unha maior seguridade para todos e un uso responsable dos servizos sanitarios, a continuación adxúntase o cadro da Sociedade Española de Urxencias Pediátricas de “Debo acudir a urxencias? Guía para pais e cuidadores”³:



¿DEBO ACUDIR A URGENCIAS? GUÍA RÁPIDA PARA PADRES Y CUIDADORES

LLAME AL 112 O ACUDA A URGENCIAS DE FORMA INMEDIATA SI:

PIEL	Mala coloración (palidez, piel moteada, coloración azul o grisácea) Aparición súbita de: manchas en piel, hinchazón de labios o párpados (sospecha de alergia) con dificultad para respirar, vómitos o mareo	RESPIRACIÓN	Dificultad para respirar grave: se marcan las costillas, respira muy rápido o pausas en la respiración, adormilado Atragantamiento y dificultad para respirar o vómitos/salivación constante
COMPORTAMIENTO	No responde a estímulos Irritabilidad o somnolencia excesivas Movimientos anormales (convulsión)	ACCIDENTES	Herida profunda con sangrado abundante que no cede tras aplicar presión durante 10 minutos Fractura abierta (se ve el hueso) Golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento

ACUDA A URGENCIAS SI:

PIEL	Manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionar Aparición súbita de manchas en piel o hinchazón de labios o párpados sin otros síntomas	RESP	Dificultad para respirar: se marcan las costillas, respira rápido, “pitido” al respirar
FIEBRE	Bebé menor de 3 meses con fiebre ($T^{\circ}\geq 38^{\circ}\text{C}$) Fiebre que asocie cualquier ítem del apartado superior (piel, comportamiento, respiración) Fiebre de más de 40.5°C	GASTROINTESTINAL	Bebé menor de 1 mes que rechaza tomas de lactancia Vómitos persistentes o diarrea abundante y frecuente durante más de 24 horas, ojos hundidos, orina poco Vómitos repetidos y dolor de cabeza fuerte Ingesta de objeto, sobre todo pilas o imanes Dolor de barriga fuerte, continuo, que empeora
COMPORTAMIENTO	Mareo, pérdida de fuerza Expresa pensamientos suicidas	ACCIDENTES	Traumatismo con deformidad aparente Herida profunda que precisa sutura Ingesta de productos tóxicos o sobredosificación de medicamentos

NO URGENTE, PIDA CONSULTA EN SU PEDIATRA SI:

PIEL	Manchas en piel que desaparecen al presionar	RESP	Tos o mocos sin dificultad para respirar
FIEBRE	Bebé entre 3 y 24 meses con $T^{\circ}>39^{\circ}\text{C}$ sin datos de alarma (apartados superiores) Fiebre ($T^{\circ}>38^{\circ}\text{C}$) durante más de 5 días	GASTROINTESTINAL	Vómitos y/o diarrea sin datos de alarma (apartado superior - gastrointestinal) Dolor de barriga no muy intenso que viene y va
OTRO	Dolor de oído durante más de dos días Ojo rojo o picor ocular	Más info en: www.seup.org/hojas-informativas/	

Bibliografía:

1. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
2. https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instruccion_adaptacion_protocolo_31-08-2020_0.pdf
3. https://seup.org/pdf_public/pub/hojas_padres/acudir_urgencias.pdf