



1) Calcula el dominio de las siguientes funciones:

a.  $f(x) = \sqrt{\frac{2x+4}{3x+9}}$

b.  $f(x) = \frac{5}{x^2-2x-3}$

c.  $f(x) = \frac{2x+6}{\sqrt{x^2-9}}$

d.  $f(x) = \ln(x+5)$

**Solución:**

a)  $f(x) = \sqrt{\frac{2x+4}{3x+9}} \rightarrow \frac{2x+4}{3x+9} \geq 0$

Calculamos las raíces del numerador y del denominador:

$$2x + 4 = 0 \rightarrow 2x = -4 \rightarrow x = -2$$

$$3x + 9 = 0 \rightarrow 3x = -9 \rightarrow x = -3$$

Construimos la tabla para ver los signos:

| $x$                 | $(-\infty, -3)$ | $-3$      | $(-3, -2)$ | $-2$ | $(-2, +\infty)$ |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|------|-----------------|
| $2(x+2)$            | -               | ...       | -          | 0    | +               |
| $3(x+3)$            | -               | 0         | +          | +    | +               |
| $\frac{2x+4}{3x+9}$ | +               | $\exists$ | -          | 0    | +               |
| $\geq 0$            | SI              | $\exists$ | NO         | SI   | SI              |

Por tanto,  $\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup [-2, +\infty) = \mathbb{R} - [-3, -2)$

b)  $f(x) = \frac{5}{x^2-2x-3}$

En este caso, los únicos puntos que dan problemas son los que anulan el denominador:

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm 4}{2} = \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

Por tanto,  $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-1, 3\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, +\infty)$

$$c) f(x) = \frac{2x + 6}{\sqrt{x^2 - 9}}$$

En esta función, como tenemos la raíz en el denominador, lo que se encuentra dentro debe ser estrictamente positivo:  $x^2 - 9 > 0$

Calculamos las raíces y construimos la tabla de signos:

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm\sqrt{9} \rightarrow x = \pm 3$$

| $x$       | $(-\infty, -3)$ | $-3$      | $(-3, 3)$ | $3$       | $(3, +\infty)$ |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| $x - 3$   | -               | -         | -         | 0         | +              |
| $x + 3$   | -               | 0         | +         | +         | +              |
| $x^2 - 9$ | +               | $\exists$ | -         | $\exists$ | +              |
| $> 0$     | SI              | $\exists$ | NO        | $\exists$ | SI             |

Luego,  $\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty) = \mathbb{R} - [-3, 3]$

$$d) f(x) = \ln(x + 5)$$

$$x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$$

En este caso,  $\text{Dom}(f) = (-5, +\infty) = \mathbb{R} - (-\infty, -5]$

2) a) Estudia la simetría de las siguientes funciones:

- $f(x) = \frac{x^5}{x^5 + x^3 - x}$

**Solución:**

$$f(-x) = \frac{(-x)^5}{(-x)^5 + (-x)^3 - (-x)} = \frac{-x^5}{-x^5 - x^3 + x} = \frac{-x^5}{-(x^5 + x^3 - x)} = \frac{x^5}{x^5 + x^3 - x}$$

$$f(x) = f(-x) \rightarrow \text{Simetría PAR}$$

$$\bullet f(x) = \frac{2x^3 + 6x}{x^4 - 2x + 1}$$

**Solución:**

$$f(-x) = \frac{2(-x)^3 + 6(-x)}{(-x)^4 - 2(-x) + 1} = \frac{-2x^3 - 6x}{x^4 + 2x - 1}$$

$$-f(x) = -\frac{2x^3 + 6x}{x^4 - 2x + 1} = \frac{-2x^3 - 6x}{x^4 - 2x + 1}$$

No tiene simetría.

- 2) b) Representa la siguiente función definida a trozos. Estudia su dominio y continuidad.

$$f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x < -3 \\ x^2 - 2x - 7 & \text{si } -3 \leq x < 2 \\ -7 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

**Solución:**

Para representar la función estudiamos cada uno de los trozos que la definen:

$$\triangleright \text{si } x < -3 \rightarrow f(x) = x - 2$$

Construimos una tabla de valores:

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| X | -3 | -4 | -5 |
| Y | -5 | -6 | -7 |

$$\triangleright \text{si } -3 \leq x < 2 \rightarrow f(x) = x^2 - 2x - 7$$

Nos encontramos ante una función de segundo grado (parábola). Por tanto estudiamos los puntos de corte con los ejes, el eje de la parábola y el vértice, además de construir una tabla de valores.

Puntos de corte con los ejes:

$$\text{Corte OX: } f(x) = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 7 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 28}}{2} = 1 \pm 2\sqrt{2}$$

De las dos soluciones que obtenemos una no es válida pues se sale del intervalo de definición ( $x = 1 + 2\sqrt{2} \approx 3.82$ )

Por tanto el punto de corte con el eje OX es:  $(1 - 2\sqrt{2}, 0)$

Corte OY:  $f(0) = 0^2 - 2 \cdot 0 - 7 = -7$

Luego el punto de corte con el eje OY es:  $(0, -7)$

Eje de la parábola:  $x = \frac{-b}{2a} = \frac{2}{2} = 1$

Vértice:  $(x, f(x)) = (1, f(1)) = (1, -8)$


Finalmente construimos una tabla de valores:

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| X | -3 | 0  | 2  |
| Y | 8  | -7 | -7 |

➤ si  $x > 2 \rightarrow f(x) = -7$

En este caso la función es constante, con lo cual su valor no cambia.

La representación gráfica de la función es la que sigue:



El dominio de la función es todos los números reales menos el 2, pues ese valor no lo toma la función.  $Dom(f) = \mathbb{R} - \{2\}$

Es una función discontinua y los puntos de discontinuidad son  $x = -3$ , pues la función tiene un salto, y  $x = 2$ , pues la función no toma ese valor.

- 3) Un almacenista de frutas ha estimado que el beneficio que le produce cada kg de fresas depende del precio de venta de acuerdo con la siguiente función:

$$B(x) = -x^2 + 4x - 3$$

Siendo  $B(x)$  el beneficio por kg y  $x$  el precio de cada kg, expresados en euros.

- ¿Entre qué precios se producen beneficios no negativos para el almacenista?
- ¿Qué precio maximiza los beneficios? ¿Cuál es ese beneficio máximo?
- Si tiene en el almacén 10000kg de fresas, ¿cuál será el beneficio total que obtenga si cada kg lo vende a un precio de 2€?

### Solución:

En primer lugar vamos a representar la función beneficios que es una parábola:

$$B(x) = -x^2 + 4x - 3$$

Comenzamos calculando los puntos de corte con los ejes:

$$\text{Corte con OX: } f(x) = 0 \rightarrow -x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{-2} = \frac{-4 \pm 2}{-2}$$

Por tanto los puntos de corte con el eje OX son: (3,0), (1,0)

$$\text{Corte con OY: } f(0) = -0^2 + 4 \cdot 0 - 3 = -3$$


Luego el punto de corte con el eje OY es: (0,-3)

$$\text{Eje de la parábola: } x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$\text{Vértice: } (x, f(x)) = (2, f(2)) = (2, 1)$$


Vamos a realizar la representación gráfica, y a partir de ella responderemos a las preguntas planteadas.

La representación gráfica es la siguiente:



- a) Como se puede observar en la gráfica, la función es no negativa en el intervalo  $[1,3]$ . Por tanto los beneficios serán no negativos si el precio  $x$  está en el intervalo de  $[1,3]$  euros.
- b) Al ser una parábola cóncava, el máximo se alcanza en el vértice de la misma. Luego el precio que maximiza los beneficios es  $x = 2\text{€}$ ; y el beneficio máximo que se obtiene es de  $1\text{€}$ .
- c) Para saber el beneficio total que se obtiene por  $10000\text{kg}$  necesitamos saber en primer lugar el beneficio que proporciona un  $\text{kg}$ . Si el precio es de  $2\text{€}$ , ya sabemos que el beneficio por  $\text{kg}$  es de  $1\text{€}$  (basta mirar la gráfica y comprobar que la imagen de  $x=2$  es  $y=1$ ). Luego si un  $\text{kg}$  proporciona un beneficio de  $1\text{€}$ , el beneficio total por los  $10000\text{ kg}$  será:  $10000 \cdot 1 = 10000\text{ €}$

- 4) Para cada una de las siguientes gráficas de funciones, indica, de forma justificada, el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y los mínimos.
- a) En esta función indica además la curvatura y los puntos de inflexión.



**Solución:**

Dominio:  $\mathbb{R}$

Creciente:  $(-1, 0)$ ,  $(1, +\infty)$

Decreciente:  $(-\infty, -1)$ ,  $(0, 1)$

Máximo relativo: en  $x=0$  pues la función pasa de ser creciente a ser decreciente y tiene la mayor imagen en un entorno del mismo.

Mínimos absolutos y relativos: en  $x=-1$  y  $x=1$  pues en ellos la función pasa de ser decreciente a creciente y alcanzan la menor imagen de toda la función y en un entorno de los puntos.


Convexa:  $(-\infty, -0.5)$ ,  $(0.5, +\infty)$  pues las ramas se abren hacia arriba.

Cóncava:  $(-0.5, 0.5)$  pues las ramas se abren hacia abajo.

Puntos de inflexión:  $x=-0.5$  (cambio de convexa a cóncava)

$x=0.5$  (cambio de cóncava a convexa)

b)



**Solución:**

Dominio:  $\mathbb{R}$

Constante:  $(-\infty, -2)$ ,  $(3, +\infty)$

Creciente:  $(-1, 0)$ ,  $(0.5, 1.5)$

Decreciente:  $(-2, -1)$ ,  $(0, 0.5)$ ,  $(1.5, 3)$

Máximo relativo: en  $x=1.5$  pues la función pasa de ser creciente a ser decreciente y tiene la mayor imagen en un entorno del mismo.

Máximo absoluto y relativo: en  $x=0$  pues la función pasa de ser creciente a decreciente y alcanzan la mayor imagen de toda la función y en un entorno del punto.

Mínimo relativo: en  $x=0.5$  pues la función pasa de ser decreciente a ser creciente y tiene la menor imagen en un entorno del mismo.

Mínimos absolutos y relativos: en  $x=-1$  pues la función pasa de ser decreciente a creciente y alcanzan la menor imagen de toda la función y en un entorno del punto.