

A EVOLUCIÓN XEOLÓXICA DA PENÍNSULA IBÉRICA

ERA ARCAICA OU PRECÁMERO

- Emerxe banda montañosa dirección NO-SE.
Son lousas e gneis
mats. duros.
↓
Galicia, Sist. Central;
Mts. Toledo e S. Morena.
- A erosión arrásao e volviu a cubrilo o mar.




ERA PRIMARIA OU PALEOZOICO → OROX. HERCINIANA.

- Xorden macizos
 - ↓
mats. duros,
(silíceos)
 - ↓
granito, lousa,
gneis
- OESTE → Hespérico
- NOROESTE → Aquitania
 - Catalano-Balear
 - Ebro
- SURESTE → Bético-Rifeño
- Erosión arrásao e converteos en zócalos.

ERA SECUNDARIA OU MESOZOICO → CALMA OROXÉNICA

- Erosión desgasta relevos do Primario.
- Sedimentación (mats. blandos = calcarias e margas) en dúas zonas cub. por mar:
 - bordo oriental da Meseta (pq está incl. ó leste e as transgr. e regr. mariñas van deixando sedim.)
↓
(poucos.)
 - fosas mariñas nas zonas pirenaica e bética.
(moitos sediment)




ERA SECUNDARIA
Fonte: Terán, M. e Solé, L.: Geografía General de España.

ERA TERCIARIA OU CENOZOICO → OROX. ALPINA

- Levántanse cord. alpinas

(Pirenaicos e Béticos) cos mts. depositados → braudos nas fosas pirenaica e bét. xa que os macizos antigos faiu presión a ambos lados.



- Formaúse depressões pre-alpinas

(Ebro e Guadalquiv.) paralelas ás novas cord. (1º ocupaas o mar e desp. éncheuse de sedim. → braudos).



- Modifícase a Meseta:

- Inclínase cara ó oeste.

- Formaúse montanhas que a bordeau ó noroeste → parte oriental Cord. Cant + Sist. Ibérico e ó sur → Serra Morena com mts. braudos do Secundario.

- Fallas e fracturas no zócolo:

- bloques levant (horst) → formau as mont. que bordeau a Meseta polo oeste: Macizo Galáico + parte occid. Cord. Cant + Sist Chal + M. Toledo
- bloques afund. (graben) → formau depressões interiores da Meseta: submesetas N e S.
- provocau activ. volcânica.

#ERA CUATERNARIA → ALTERNANCIAS CLIMÁTICAS

- Glacianismo — Pireneos

/ \

de círco de val

Cord. Cantábrica
Sist. Central
Sist. Ibérico
Serra Nevada.

- Terrazas fluviais → frauxas planas e elevadas situadas nas marxes dun río.

→ orixe = alternancias climáticas do Cuaternario.

→ Exs. Douro, Texo, Guadiana, Guadalquivir e Ebro.

- Erosión (incluída a antropica).